

ГБУЗ СО «ГБ г. Асбест»	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА		Номер: Лист: 1 Всего: 2
НАЗВАНИЕ: Базовая сердечно-легочная реанимация			Подразделение: клинические и параклинические отделения
Действует с «15» 07 2022 года	ЗАМЕНЯЕТ: Водится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	Дата следующего пересмотра:
СОСТАВИЛ:		Утвердил: Главный врач ГБУЗ СО «ГБ г. Асбест» «15» 07 2022 Брагин И.В./	
<p>Цель: Стандартизация проведения базовой сердечно-легочной реанимации.</p> <p>Область применения: : Клинические и параклинические отделения Ответственность: Медицинские работники</p> <p>Нормативные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" - Федеральный Закон От 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об Обязательном Медицинском Страховании В Российской Федерации" - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» - Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015 г., 41 с <p style="text-align: center;">Основная часть СОП</p> <p>Выполнение процедуры Алгоритм действий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пациента 2. Осторожно встряхнуть пациента за плечи 3. Громко обратиться к ребенку по имени. При отсутствии сознания призвать на помощь: «Помогите, ребенку плохо!» Попросить вызвать реаниматолога или скорую помощь. Начать оказывать медицинскую помощь. 4. Для проверки дыхания производится открытие дыхательных путей путем запрокидывания головы и подъема подбородка (для этого одну ладонь кладут на лоб пациента, двумя пальцами другой поднимают подбородок, запрокидывая голову назад и выдвигая нижнюю челюсть вперед и вверх), освобождая дыхательные пути. <p>Определить признаки жизни Приблизить ухо к губам пациента. Метод «вижу-слышу-ощущаю» считать вслух до 10 при отсутствии дыхания начинать сердечно-легочную реанимацию</p> <p>Выполнение</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встать на колени сбоку от пациента лицом к нему 2. Освободить грудную клетку от одежды 3. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пациента 4. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок, отогнув пальцами руки сверху пальцы руки снизу 5. Выполнить 30 компрессий подряд, считая вслух 6. Руки вертикальны и не сгибаются в локтях 7. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней 8. На рот пациента положить салфетку или маску (защита себя) 9. Ладонь одной руки положить на лоб пациента, 1-ым и 2-ым пальцами зажать нос пациенту, подхватить нижнюю челюсть двумя пальцами другой руки 10. Запрокинуть голову пациента, освобождая дыхательные пути, набрать в легкие воздух, сделать вдох в рот пациента, при этом зажав нос и плотно обхватить его губы своими губами 11. Освободить губы пациента на 1-2 секунды, в это время сделать новый вдох и повторить выдох в пациента. 12. Повторить цикл сердечно-легочной реанимации 13. Глубина компрессий составляет 5-6 см <p>Примечания</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Глубина компрессий составляет 5-6 см 2. Указанные мероприятия производятся до появления у пострадавшего признаков жизни либо до прибытия реаниматолога или скорой медицинской помощи. 3. Детям до года компрессию проводят двумя большими пальцами 			

